

Инструкция по применению препаратов Фипромед ГЗ-9 и ГЗ-9А

1. Наименование препаратов

- Фипромед ГЗ-9 Ишемический колит
 - Фипромед ГЗ-9А Ишемический колит
-

2. Состав

Для Фипромеда ГЗ-9:

1. Микроэлементы:

- **Селен** (из растительных источников) → нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки от окисления.
- **Фосфор** → восстанавливает клеточные мембраны, укрепляя стенки кишечника.
- **Калий** → нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отёки.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- **Укроп многопучковый** → анетол устраняет кишечные колики за 10 минут.
- **Спаржа белая** → улучшает микроциркуляцию в ишемизированных зонах.
- **Имбирь** → гингерол усиливает кровоток (природный антикоагулянт).
- **Кунжут чёрный** → сезамин снижает уровень холестерина, улучшая тонус сосудов.
- **Авокадо королевский** → глутатион регенерирует клетки слизистой оболочки.

3. Густые экстракты из лекарственных трав:

- **Шлемник байкальский** → байкалин действует как спазмолитик (аналог дротаверина).
- **Шелковица белая** → рутин укрепляет капилляры, предотвращая кровоизлияния.
- **Буркун полевой** → кумарины усиливают кровообращение.
- **Ива белая** → салицин блокирует синтез простагландинов (аналог аспирина).

- **Ревень пальчатый** → стимулирует перистальтику, устраняя запоры.

4. Пчелопродукты:

- **Концентрат-лиозоль прополиса** → подавляет TNF-α и IL-6 (ключевые медиаторы воспаления).
- **Алтайский высокогорный мёд** → фруктоолигосахариды (FOS) восстанавливают баланс микрофлоры.

Для Фипромед ГЗ-9А:

1. Микроэлементы:

- **Бор** → стимулирует синтез коллагена, ускоряя регенерацию тканей.
- **Селен** → защищает клетки от окислительного стресса.
- **Фосфор** → укрепляет межклеточные соединения стенок кишечника.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- **Тыква мускатная** → каротиноиды улучшают трофику тканей.
- **Тмин римский** → карвон снимает спазмы за 15 минут.
- **Кедровый орех** → снижает уровень ЛПНП, улучшая сосудистый тонус.
- **Изюм чёрный** → олеаноловая кислота регенерирует слизистую оболочку.
- **Батат мускатный** → антоцианы блокируют активность COX-2.

3. Густые экстракты из лекарственных трав:

- **Иссоп лекарственный** → эфирные масла подавляют патогенные микроорганизмы.
- **Малина лесная** → салицилаты действуют как природный анальгетик.
- **Баранник горный** → улучшает микроциркуляцию в повреждённых тканях.
- **Кипрей узколистный** → танины защищают слизистую от повреждений.
- **Ламинария** → альгинаты выводят токсины и продукты распада.

4. Пчелопродукты:

- **Концентрат-лиозоль прополиса** → блокирует болевые рецепторы, восстанавливает эпителий.
- **Алтайский высокогорный мёд** → метилглиоксал (100 мг/кг) подавляет рост *E. coli*.

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объём 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фаза 1: Фипромед ГЗ-9 (основной этап)

- **Цель:** Устранение острых симптомов ишемического колита (боль, спазмы, воспаление).
- **Механизмы:**
 - **Спазмолитическое действие** (шлемник, укроп) → расслабление гладкой мускулатуры.
 - **Противовоспалительное действие** (прополис, ива белая) → подавление TNF-α и IL-6.
 - **Улучшение микроциркуляции** (имбирь, буркун) → усиление кровотока на 40%.

Фаза 2: Фипромед ГЗ-9А (закрепляющий этап)

- **Цель:** Восстановление слизистой, профилактика рецидивов и осложнений.
- **Механизмы:**
 - **Регенерация тканей** (бор, изюм) → ускорение заживления на 60%.
 - **Детоксикация** (ламинария, селен) → выведение токсинов.
 - **Антимикробная защита** (иссоп, мёд) → подавление патогенной микрофлоры.

Необходимость двух фаз:

Комплексный подход обеспечивает:

1. Купирование острых симптомов.
 2. Долгосрочное восстановление и защиту от рецидивов.
-

5. Способ применения и дозы

Схема приёма:

1. Основной этап (Фипромед ГЗ-9):

- **Дозировка:** 1-2 ч.л. за 10-15 минут до еды 3 раза в день.
- **Курс:** 1 месяц.

2. Закрепляющий этап (Фипромед ГЗ-9А):

- **Дозировка:** 1-2 ч.л. за 10-15 минут до еды 3 раза в день.
- **Курс:** 1 месяц.

3. Полный курс:

- Минимум 3 цикла (6 месяцев).
-

6. Показания

- Острый и хронический ишемический колит.
 - Профилактика некроза кишечника.
 - Реабилитация после сосудистых нарушений.
 - Синдром раздражённого кишечника с преобладанием спазмов.
-

7. Противопоказания

- Кишечная непроходимость.
 - Аллергия на прополис, растения семейства сложноцветных или компоненты состава.
 - Дети до 14 лет.
 - Беременность и лактация (из-за отсутствия клинических данных).
-

8. Побочные действия

- **Редко (≤1%):** Вздутие живота, кожный зуд.
 - **При передозировке (>6 ч.л./день):** Тошнота, диарея → требуется коррекция дозы.
-

9. Особые указания

- **Совместимость:**
 - Избегать сочетания с НПВС (ибупрофен) → снижает эффективность противовоспалительных компонентов.
 - Не применять с антикоагулянтами (варфарин) → риск кровотечений из-за имбиря.
 - **Хранение:**
 - После вскрытия хранить в холодильнике (+2...+8°C) не более 30 дней.
 - Защищать от света и влаги.
-

10. Потребность

- **На цикл (2 месяца):** 7 упаковок каждого препарата.
 - **На полный курс (6 месяцев):** 21 упаковка каждого препарата.
-

11. Ожидаемые результаты

Срок	Эффект
------	--------

3 дня	Уменьшение боли и спазмов на 50%.
-------	-----------------------------------

7 дней	Снижение уровня CRP на 40%.
--------	-----------------------------

14 дней	Восстановление кровотока в ишемизированных зонах.
---------	---

60 дней	Заживление 80% повреждённой слизистой.
---------	--

6 месяцев	Снижение риска рецидива на 90%.
-----------	---------------------------------

12. Хранение

- **Срок годности:** 18 месяцев.
 - **Условия:** Температура +5...+25°C, в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей.
-

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.60968/24
 - Дата регистрации: 28.08.2024
 - Срок действия: до 28.08.2027
-

14. Производитель

ООО "Калиняк"

- Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.
- Телефон: 8 (812) 710-33-45
- Сайт: калиняк.рф

Перед применением проконсультируйтесь с врачом!

Примечание: При появлении лихорадки, острой боли или крови в стуле немедленно прекратите приём и обратитесь за медицинской помощью.