

Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-6

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-6 Запор

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- **Цинк** (из кедровых орехов).
- **Кальций** (из чёрного кунжута).
- **Марганец** (из ананаса).

2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Ревень пальчатый (корень).
- Бузина чёрная (плоды).
- Любисток (корень).
- Солодка голая (корень).
- Вахта трехлистная (листья).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Личи китайское (плоды).
- Кедровый орех (ядро).
- Ананас хохлатый (соплодие).
- Куркума длинная (корень).
- Кунжут индийский чёрный (семена).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Стимуляция перистальтики:

- **Ревень пальчатый** (сеннозиды):
→ Активируют хлоридные каналы в энтероцитах, усиливая секрецию воды и перистальтику.
- **Цинк** (в форме пиколината):
→ Стимулирует синтез ацетилхолина, повышая тонус гладкой мускулатуры кишечника.

2. Смягчение стула:

- **Вахта трехлистная** (мениантин):
→ Увеличивает осмотическое давление в просвете кишечника, удерживая воду.
- **Мёд** (фруктоолигосахариды):
→ Служит субстратом для бифидобактерий, смягчая консистенцию стула.

3. Противовоспалительное и защитное:

- **Солодка голая** (глицирризиновая кислота):
→ Ингибирует фосфолипазу A₂, снижая синтез провоспалительных эйкозаноидов.
- **Куркума** (куркумин):
→ Блокирует NF-κB, подавляя экспрессию IL-6 и TNF-α.

4. Антиметеоризм:

- **Любисток** (фталиды):
→ Ингибирует α-галактозидазу, уменьшая газообразование.

5. Метаболическое:

- **Марганец** (в форме глюконата):
→ Активирует пируваткиназу, ускоряя гликолиз и энергообеспечение клеток.

5. Показания

- Острый и хронический запор (обстипация) неорганического происхождения.
 - Симптоматическое лечение вздутия, метеоризма и дискомфорта в ЖКТ.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
 - Кишечная непроходимость, кровотечения ЖКТ.
 - Беременность и лактация.
-

7. Способ применения и дозы

- **При остром запоре:**
 - По 2 ч.л. за 20-30 минут до еды 3-4 раза в день.
 - Максимальная суточная доза: 8 ч.л.
- **Для профилактики:**
 - По 1 ч.л. утром и вечером до еды в течение 14 дней.

Рекомендации:

- Употреблять не менее 1,5 л воды в сутки.
 - Добавлять в рацион продукты с клетчаткой (отруби, яблоки).
-

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, гиперемия).
 - При тяжелых реакциях: прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Не применять при подозрении на органическую патологию кишечника.
 - При отсутствии эффекта в течение 24 часов требуется консультация врача.
-

10. Взаимодействие

- Снижает эффективность при одновременном приеме с сорбентами.
-

11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике.
-

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д- RU.PA07.B.60961/24**
 - Дата регистрации: **28.08.2024**
 - Срок действия: **до 28.08.2027**
-

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

Важно!

- При хронических запорах курс повторяют каждые 2 месяца под контролем врача.
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.