

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препаратов

ФИПРОМЕД Ж2-9 и ФИПРОМЕД Ж2-9А

(жидкие экстракты для комплексной коррекции полипов матки)

Регистрационные данные

Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45922/24 от 23.08.2024
(действует до 23.08.2027).

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препаратов

- **Фипромед Ж2-9** (для первой половины менструального цикла).
 - **Фипромед Ж2-9А** (для второй половины менструального цикла).
-

2. Состав

Фипромед Ж2-9

Действующие компоненты:

- **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
Железо, Медь, Селен, Кобальт, Молибден.
Источники: арахис испанский, артишок фиолетовый (плоды), тмин обыкновенный (семена), эрука посевная (листья), калина красная (плоды).
- **Растительные экстракты:**
Нигелла дамасская (семена), котовник многонадрезный (трава), аир болотный (корень), астра татарская (трава), горечник байкальский (корень).
- **Пчелопродукты:**
Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Фипромед Ж2-9А

Действующие компоненты:

- **Микроэлементы** (источники аналогичны Фипромеду Ж2-9).
- **Растительные экстракты:**
Острокольник шишковидный (трава), манжетка лекарственная (трава), мoringa масличная (листья), тысячелистник обыкновенный (трава), камнеломка толстолистная (корневище).
- **Пчелопродукты:**
Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Полипы матки — доброкачественные образования эндометрия, сопровождающиеся кровотечениями, болями и риском малигнизации. Препараты оказывают комплексное действие:

Фипромед Ж2-9 (первая половина цикла):

- **Улучшение микроциркуляции:**
 - Железо + Медь: Стимулируют синтез гемоглобина и коллагена, усиливая оксигенацию тканей.
- **Противовоспалительный эффект:**
 - **Прополис (CAPE):** Ингибирует ЦОГ-2 и NF-κB, снижая синтез провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α).
 - Нигелла дамасская (тимохинон): Блокирует активацию гиалуронидазы, уменьшая отёк.
 - Горечник байкальский (байкалин): Подавляет избыточный ангиогенез в полипах через ингибирование VEGF.
- **Иммуномодуляция:**
 - Селен + Прополис: Активируют фагоцитоз и синтез интерферонов (IFN-γ).

- **Детоксикация:**
 - Аир болотный (азарон): Ускоряет выведение токсинов через активацию цитохрома P450.
 - Молибден: Участвует в метаболизме ксенобиотиков.

Фипромед Ж2-9А (вторая половина цикла):

- **Снижение воспаления:**
 - Острокольник шишковидный (рутин): Ингибирует ЦОГ-2 и синтез лейкотриенов.
 - Тысячелистник (ахиллеин): Уменьшает проницаемость сосудов, подавляя гистаминовые рецепторы.
- **Гормональная регуляция:**
 - Манжетка лекарственная (фитостерины): Нормализует соотношение эстрадиол/прогестерон.
 - Моринга масличная (изотиоцианаты): Ингибирует ароматазу, снижая уровень эстрогена.
- **Регенерация тканей:**
 - **Прополис (артепиллин С):** Стимулирует синтез коллагена через активацию TGF-β.
 - Камнеломка толстолистная (бергенин): Ускоряет эпителизацию эндометрия.
- **Антиоксидантная защита:**
 - Селен + Мёд (метилглиоксаль): Нейтрализуют свободные радикалы, снижая окислительный стресс.

5. Показания

- Полипы матки (железистые, фиброзные, аденоматозные).
 - Профилактика рецидивов после гистероскопического удаления полипов.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, бобовые, растения).
 - Беременность, лактация.
 - Острые воспалительные процессы в малом тазу.
 - Подозрение на злокачественные образования.
-

7. Способ применения и дозы

Обязателен совместный приём:

- **Фипромед Ж2-9:**
 - Дни приёма: 1–7 день цикла (после менструации).
 - Дозировка: 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.
- **Фипромед Ж2-9А:**
 - Дни приёма: 15–28 день цикла (за 14 дней до менструации).
 - Дозировка: 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.

Курс:

- Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
 - Оптимальный курс: 6 менструальных циклов.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (зуд, сыпь), дискомфорт в ЖКТ.
 - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна перед началом терапии и каждые 3 месяца.
- Не совмещать с гормональными препаратами без согласования с врачом.
- **Важно!** Препараты применяются только в комплексе:
 - Ж2-9 — первая половина цикла.

- Ж2-9А — вторая половина цикла.
 - При нерегулярном цикле: Коррекция схемы приёма по назначению специалиста.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Вспомогательные компоненты: Состав уточняется производителем.
 - Инструкция актуальна на: 23.08.2024.
-

Ключевые особенности

- **Синергия компонентов:**
 - **Прополис** обеспечивает комплексное действие:
 - Противовоспалительное (ингибирование ЦОГ-2, NF-κB).
 - Регенеративное (активация TGF-β, синтез коллагена).
 - Антиоксидантное (нейтрализация свободных радикалов).
 - **Манжетка и моринга** регулируют гормональный баланс, подавляя избыток эстрогена.
 - **Камнеломка и тысячелистник** ускоряют заживление эндометрия.
 - **Селен + мёд** усиливают антиоксидантную защиту.