

Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-8

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-8 Запах изо рта

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- **Кобальт** (из лещины крупной).
- **Сера** (из сои Китросса).
- **Фосфор** (из кедровых орехов).

2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Шалфей (листья).
- Корица цейлонская (кора).
- Календула (соцветия).
- Розмарин (надземная часть).
- Смородина чёрная (плоды).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Ирга ольхолистная (плоды).
- Лещина крупная (плоды).
- Соя Китросса (семена).
- Кедровый орех (ядро).
- Нут бараний (бобы).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Антибактериальное:

- **Шалфей** (сальвин):
→ Ингибирует синтез бактериальной ДНК-гиразы, подавляя рост патогенов (включая *Helicobacter pylori*).
- **Корица цейлонская** (циннамальдегид):
→ Нарушает целостность мембран грамотрицательных бактерий, вызывающих гнилостные процессы.

2. Регенеративное и противовоспалительное:

- **Календула** (календен):
→ Активирует TGF- β , ускоряя заживление микротрещин слизистой ротовой полости и ЖКТ.
- **Сера** (в форме метилсульфонилметана):
→ Участвует в синтезе глутатиона, усиливая детоксикацию и защиту клеток.

3. Пробиотическое:

- **Мёд** (олигосахариды):
→ Стимулирует рост *Bifidobacterium* и *Lactobacillus*, восстанавливая баланс микрофлоры кишечника.

4. Метаболическое:

- **Фосфор** (в форме фосфатидилхолина):
→ Участвует в синтезе АТФ, улучшая энергообеспечение клеток слизистой ЖКТ.

5. Антиоксидантное:

- **Ирга ольхолистная** (антоцианы):
→ Нейтрализует свободные радикалы через активацию Nrf2-зависимых путей.
-

5. Показания

- Галитоз (неприятный запах изо рта), вызванный дисбиозом, воспалением ЖКТ или патогенной микрофлорой.
 - Профилактика рецидивов хронического гастрита и стоматита.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
 - Беременность и период лактации.
 - Острые язвенные поражения ЖКТ.
-

7. Способ применения и дозы

- **Экстренная помощь:**
 - Распределите 1-2 ч.л. препарата в ротовой полости, рассасывайте 2-3 минуты, затем прополощите водой с лимонным соком.
- **Для долговременного эффекта:**
 - По 1-2 ч.л. после каждого приёма пищи (3 раза в день).
 - Курс: 1 месяц (7 упаковок).

Рекомендации:

- Исключите продукты, усиливающие галитоз (лук, чеснок, кофе).
 - Используйте скребок для языка утром и вечером.
-

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, гиперемия).
 - При тяжелых реакциях: прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Не заменяет терапию основного заболевания (гастрит, дисбактериоз).
- При отсутствии улучшений в течение 7 дней требуется консультация гастроэнтеролога.

10. Взаимодействие

- Не совмещать с ополаскивателями на спиртовой основе.
 - Сорбенты (активированный уголь) принимайте за 2 часа до или после препарата.
-

11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике.
-

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д- RU.PA07.B.60961/24**
 - Дата регистрации: **28.08.2024**
 - Срок действия: **до 28.08.2027**
-

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога или стоматолога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

Важно!

- При хроническом галитозе курс повторяют каждые 3 месяца под контролем врача.
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.