

Инструкция по применению препаратов Фипромед Г4-4 и Г4-4А

1. Наименование препаратов

- Фипромед Г4-4 Проктит
 - Фипромед Г4-4А Проктит
-

2. Состав

Для Фипромеда Г4-4 (приём до еды):

1. Микроэлементы:

- Марганец → мощный антиоксидант, защищает клетки от окислительного стресса.
- Молибден → нормализует метаболизм, снижая болевые ощущения.
- Сера → блокирует NF-κB, подавляя воспаление.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов (суперфуды):

- Рябина черноплодная → антоцианы укрепляют сосуды, останавливая кровь.
- Куркума длинная → подавляет IL-6, снижая отёк.
- Абрикос царский → витамин А ускоряет регенерацию слизистой.
- Дикая роза → витамин С усиливает иммунитет.
- Соя Китросса → снижает проницаемость тканей, предотвращая осложнения.

3. Густые экстракты лекарственных трав:

- Золототысячник обыкновенный → заживляет эрозии, останавливая кровоточивость.
- Лён посевной → обволакивает слизистую, защищая от раздражения.
- Подорожник большой → снимает спазмы, уменьшая боль.
- Ламинария японская → выводит токсины, насыщает йодом.
- Тысячелистник обыкновенный → природный антисептик: предотвращает инфекции.

4. Пчелопродукты:

- Лиозоль прополиса → подавляет COX-2, снижая отёк и боль.
- Алтайский мёд → создаёт защитную плёнку, стимулируя регенерацию.

Для Фипромед Г4-4А (приём после еды):

1. Микроэлементы:

- Йод → усиливает антимикробную защиту, подавляя патогены.
- Сера + Марганец → ускоряют синтез коллагена, восстанавливая ткани.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов (суперфуды):

- Нут чёрный → цинк ускоряет заживление микротрещин.
- Жёлуди дуба каменистого → танины останавливают кровотечения.
- Смородина чёрная → витамин С укрепляет сосуды.
- Нори красная → выводит токсины, насыщает йодом.
- Соя Китросса → снижает риск хронизации воспаления.

3. Густые экстракты лекарственных трав:

- Анис обыкновенный → расслабляет мускулатуру, снимая спазмы.
- Солодка голая → обволакивает слизистую, защищая от кислоты.
- Крапива двудомная → улучшает микроциркуляцию, уменьшая боль.
- Гранат обыкновенный → блокирует IL-6, подавляя воспаление.
- Синюха голубая → заживляет эрозии, предотвращая рубцы.

4. Пчелопродукты:

- Лиозоль прополиса → разрушает бактерии и грибки, как природный антибиотик.
- Алтайский мёд → ускоряет эпителизацию, восстанавливая слизистую.

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фаза 1 (Фипромед Г4-4 — приём до еды):

Цель: Экстренная помощь — устранение воспаления, остановка кровотечения, снятие спазмов.

- **Противовоспалительный эффект:** Куркума и сера блокируют TNF-α и NF-κB, снижая отёк.
- **Кровоостанавливающее действие:** Рябина и золототысячник укрепляют сосуды.
- **Обезболивание:** Прополис блокирует TRPV1-рецепторы, устраняя боль за 15 минут.

Почему до еды?

Компоненты быстро всасываются, обеспечивая немедленное действие: снижение воспаления, остановку крови и подготовку тканей к регенерации.

Фаза 2 (Фипромед Г4-4А — приём после еды):

Цель: Глубокая регенерация и профилактика осложнений.

- **Заживление тканей:** Синюха и нут стимулируют рост новых клеток.
- **Антисептическое действие:** Прополис и тысячелистник предотвращают инфицирование.
- **Детоксикация:** Ламинария и нори выводят токсины, очищая организм.

Почему после еды?

Компоненты работают в условиях стабильного кровотока, усиливая восстановление и защиту слизистой.

Синергия препаратов:

- Г4-4 устраняет острые симптомы, повышая эффективность Г4-4А.
- Прополис в обоих препаратах обеспечивает непрерывное противовоспалительное и антибактериальное действие.
- Соя Китросса (Г4-4 и Г4-4А) → комбинация снижает риск хронизации воспаления.

5. Показания

- Острый и хронический проктит (боль, спазмы, кровотечения).
- Профилактика свищей и перфорации кишечника.
- Восстановление слизистой после травм.

6. Противопоказания

- Обострение с некрозом тканей.
 - Аллергия на прополис, пчелопродукты или компоненты состава.
 - Дети до 18 лет.
-

7. Способ применения и дозы

- **Фипромед Г4-4:** 1-2 ч.л. за 10 минут до еды, 3 раза/день.
 - **Фипромед Г4-4А:** 1-2 ч.л. через 15 минут после еды, 3 раза/день.
 - **Курс:** 30 дней (7-10 упаковок каждого препарата).
 - **Рекомендации:**
 - Исключите: острую, жирную пищу, алкоголь.
 - Добавьте: продукты с клетчаткой (овощи, злаки), питьевой режим (1.5–2 л/день).
-

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, покраснение), лёгкая диарея.
-

9. Особые указания

- Не совмещайте с антикоагулянтами (варфарин) → риск усиления кровотечений.
 - При повышении температуры или гнойных выделениях → прекратите приём и обратитесь к врачу.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике не более 30 дней.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

12. Регистрационные данные

- Регистрационный номер Декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-
RU.PA07.B.60968/24
 - Дата регистрации: 28.08.2024
 - Срок действия: до 28.08.2027
-

Примечание: Перед применением проконсультируйтесь с врачом.